

CODI-AMIN 48 L SUPER

Aminoácidos al 48%



Composición	p / v
Aminoácidos Libres	48.00 %
Nitrógeno Total (N)	11.20 %
Nitrógeno Orgánico (N)	11.20 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	1.00 %
Potasio (K ₂ O)	1.00 %
Materia Orgánica	25.40 %
Extracto Húmico Total (EHT)	5.40 %
Extracto de Algas Marinas	3.50 %
Factores de Crecimiento	43 ppm
Densidad	1.20 - 1.30 g/mL
pH	5.0 - 6.0

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

- 1** **CODI-AMIN 48L SUPER**, es un bioactivador orgánico de alta asimilación, formulado a base de Aminoácidos, Extractos Húmicos, Extractos de Algas Marinas y Factores de crecimiento.
- 2** **CODI-AMIN 48L SUPER**, contiene Aminoácidos que son indispensables para la formación de proteínas. Es recomendado su uso durante el periodo de crecimiento y en floración, para proporcionar mayores rendimientos y mas calidad en las cosechas.
- 3** **CODI-AMIN 48L SUPER**, aporta Extracto de Algas Marinas que son promotores fitohormonas naturales y proveen resistencia a las plantas sometidas a estrés de transplante, heladas, sequías, salinidad y otros.
- 4** **CODI-AMIN 48L SUPER** aporta Extractos Húmicos Totales que ayudan a que los nutrientes aportados sean rápidamente asimilados y transportados metabólicamente donde el cultivo lo requiere.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.25 – 0.5	Aplicar luego del 1er aporque haciendo dos aplicaciones como mínimo cada 15 días.
Tomate, Ají, Páprika, Pimiento	0.25 – 0.5	Aplicar en el almácigo y 15 días después del transplante. Realizar tres aplicaciones como mínimo.
Espárrago	0.25 – 0.5	Aplicar a partir del tercer brote cada 15 días repetir la aplicación durante 3 a 4 veces.
Cebolla, Ajo, Poro	0.25 – 0.5	Aplicar 15 a 20 días después del transplante y repetir a los 15 días.
Frutales, Cítricos, Palto, Olivo, Mango	0.5 – 1	Aplicar durante la formación de nuevos brotes, al inicio de la floración y el inicio de la fructificación.
Vid	0.5 – 1	Aplicar al inicio de la formación de los racimos, cuando tenga 3 mm de diámetro y después del raleo.
Arroz	0.25 – 0.5	Aplicar al inicio del macollamiento y en punto de algodón.
Algodón	0.25 – 0.5	Aplicar en la etapa de desarrollo.
Caña de Azúcar	0.25 – 0.5	Aplicar 60 días después del corte.
Alcachofa	0.25 – 0.5	Aplicar 30 días después del transplante.
Maíz	0.25 – 0.5	35 días después de la siembra y en etapa de desarrollo.



CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com