

CODIFOL

20 - 20 - 20



Composición	p / v
Nitrógeno Total	20.00 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	20.00 %
Potasio (K ₂ O)	20.00 %
Ácidos Policarboxílicos	5.00 %
Microelementos	0.50 %
Densidad	1.40 - 1.50 g/mL
pH	5.5 - 6.5

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

- 1 **CODIFOL 20-20-20** es un fertilizante foliar líquido a base de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Microelementos, enriquecidos con Ácidos Policarboxílicos, desarrollado especialmente para promover un rápido crecimiento vegetativo.
- 2 **CODIFOL 20-20-20** nos ayuda a obtener y mantener el equilibrio nutricional en el cultivo agrícola; recomendando su aplicación en las etapas iniciales, en momentos que es necesario prevenir y corregir deficiencias. Además contiene micronutrientes para una adecuada nutrición de la planta.
- 3 **CODIFOL 20-20-20** contiene Ácidos Policarboxílicos que ayuda a la asimilación de los elementos y el transporte dentro de la planta a los órganos donde esta lo requiere.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa: Sierra y Costa	0.5 - 1	1º 20 a 25 días después de la emergencia. 2º 15 a 20 días después de la primera. 3º 15 a 20 días después de la segunda.
Tomate, Aji, Páprika, Pimiento	0.5 - 1	1º 20 a 25 días después de la emergencia. 2º 15 a 20 días después de la primera. 3º 15 a 20 días después de la segunda.
Frijol, Vainita, Arveja	0.5 - 1	1º Cuando tenga 3 a 4 hojas verdaderas. 2º 15 a 20 días después de la primera. 3º 15 a 20 días después de la segunda.
Alfalfa	1 - 1.5	Aplicaciones desde los 8 días después del corte.
Algodón	0.5 - 1	1º Después del desahije. 2º Aplicación antes de la floración.
Frutales, Cítricos, Palta, Olivo, Mango	0.5 - 1	1º Al inicio del brotamiento, repetir 2 a 3 veces cada 15 días.
Cebolla, Ajo, Poro	0.5 - 1	1º A los 15 días del trasplante. 2º 15 días después de la primera. 3º 15 días después de la segunda.
Melón, Sandía, Zapallo	0.5 - 1	1º A los 15 días después de la siembra. 2º 15 a 20 días después de la primera. 3º 15 a 20 días después de la segunda.
Arroz	0.5 - 1	1º A los 15 días después del trasplante. 2º Al inicio del macollamiento. 3º 15 días después de la segunda.
Maíz	0.5 - 1	1º Aplicar de 1 a 4 hojas verdaderas. 2º Aplicar 20 días después de la primera.
Plantas ornamentales y aromáticas	0.5 - 1	1º A los 25 días después de la siembra. 2º 15 - 20 días después de la primera. 3º 15 días después de la segunda.
Alcachofa	0.5 - 1	Macollamiento, inicio y formación de capítulos.
Caña de Azúcar	0.5 - 1	Aplicar 30 días después del corte.
Vid	0.5 - 1	Inicio de floración y crecimiento de baya.
Espárrago	0.5 - 1	Aplicar en etapas de brotamiento.

Distribuido por:
Consortio Distribuidor Agrícola S.A.C.
 Av. Argentina 1959, Callao – Perú
 Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
 E-mail: ventas@codiagroperu.com
 Web Site: www.codiagroperu.com

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
 Soluciones para la agricultura moderna