

# CODIFOL PK

0 - 25 - 40



Composición	p / v
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	25.00 %
Potasio (K <sub>2</sub> O)	40.00 %
Ácidos Policarboxílicos	26.00 %
Aminoácidos	2.50 %
Algas Marinas	1.00 %
Microelementos	1.00 %
pH	6.5 - 7.5
Densidad	1.30 - 1.40 g/mL

**CODIAGRO**

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.  
Soluciones para la agricultura moderna

[www.codiagroperu.com](http://www.codiagroperu.com)

# CARACTERÍSTICAS

- 1 **CODIFOL PK 0-25-40** es un nutriente foliar balanceado con Fósforo y Potasio, los cuales son tomados por la planta en forma inmediata y son translocados a través de las hojas y tallos gracias al contenido de los aminoácidos, algas marinas y microelementos presentes en su composición.
- 2 **CODIFOL PK 0-25-40** tiene potasio en alta concentración, induce a la formación de carbohidratos esenciales para ser transformados en azúcares y almidones en los frutos y órganos de reserva de las plantas.
- 3 **CODIFOL PK 0-25-40** contiene algas marinas de la especie *Ascophyllum nodosum* que son promotoras de fitohormonas naturales que intervienen en todo el proceso de desarrollo del cultivo.
- 4 **CODIFOL PK 0-25-40** contiene aminoácidos que son promotores y catalizadores de los procesos metabólicos esenciales en las plantas (fotosíntesis, respiración celular, formación de lignina, etc). Ayudan a superar situaciones de estrés en los cultivos.

## CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Alcachofa	0.5 – 1	Macollamiento, inicio y llenado de inflorescencias.
Papa	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración y en llenado de tubérculos.
Espárrago	0.5 – 1	Aplicar en el desarrollo del 1er y 2do brote.
Arroz	0.5 – 1	Aplicar en punto de algodón y al cuajado de granos.
Hortalizas	0.5 – 1	Aplicar a los 30 y 45 días de la siembra.
Leguminosas	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración, repetir 15 y 30 días después.
Tomate, Ají, Pimiento	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración, floración, cuajado, llenado y acabado de frutos.
Vid	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración, al cuajado y llenado de racimos.
Cucurbitáceas	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración, al cuajado y llenado de frutos.
Cítricos, Palto, frutales	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración y al cuajado de los primeros frutos. Repetir a los 20 días de la 2da aplicación.
Marygold	0.5 – 1	Aplicar en pre-floración, 50% de floración y 15 días después de la 2da. aplicación.



CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.  
Soluciones para la agricultura moderna

Distribuido por:  
**Consortio Distribuidor Agrícola S.A.C.**  
Av. Argentina 1959, Callao – Perú  
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108  
E-mail: [ventas@codiagroperu.com](mailto:ventas@codiagroperu.com)  
Web Site: [www.codiagroperu.com](http://www.codiagroperu.com)