



CODIQUEL CaB

FERTILIZANTE FOLIAR Ca + B DE ALTA ASIMILACIÓN



Composición	p / v
Calcio (CaO)	11.00 %
Boro (B) Acomplejado con Etanolamina	1.00 %
Ácidos Policarboxílicos	20.00 %
Extractos de Algas Marinas	1.00 %
Densidad	1.25 - 1.35 g/mL
pH	4.5 - 5.0

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna

www.codiagroperu.com

CARACTERÍSTICAS

- 1** **CODIQUEL Ca-B** es un fertilizante con alto contenido de Calcio y Boro altamente asimilables y disponibles para las plantas, es recomendable para todo tipo de cultivos para prevenir y corregir deficiencias de estos elementos.
- 2** **CODIQUEL Ca-B** previene la caída de flores y frutos y la pudrición apical en tomate y pimiento, mejora la calidad del producto cosechado.
- 3** **CODIQUEL Ca-B** adicionalmente contiene Extractos de Algas Marinas y Ácidos Policarboxílicos, los cuales permiten que el Calcio y Boro sean tomados por la planta en forma inmediata y sean asimilados rápidamente a través de sus hojas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0,5 - 1,0	Aplicar luego de la floración cada 15 días haciendo dos aplicaciones como mínimo.
Algodón	0,5 - 1,0	Aplicar luego de la floración cada 15 días haciendo dos aplicaciones como mínimo.
Tomate, Ají, Páprika y Pimiento	0,5 - 1,0	Aplicar antes de la floración y en plena fructificación, realizar tres aplicaciones como mínimo.
Brócoli, Alcachofa	0,5 - 1,0	Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia y repetir a los 15 días.
Lechuga, Apio	0,5 - 1,0	Aplicar desde los 30 días después del transplante y repetir cada 10 días en 3 oportunidades.
Espárrago	1,0 - 1,5	Aplicar al primer brote y a inicios del segundo brote.
Vid	0,5 - 1,0	Aplicar desde que la uva tenga 3 mm de diámetro cada 15 días en 3 a 4 oportunidades.
Arroz	0,5 - 1,0	Aplicar en punto de algodón y al inicio del llenado de la espiga.
Maíz	0,5 - 1,0	Aplicar a inicio de formación de mazorcas y repetir la aplicación a los 10 días.
Cítricos	0,5 - 1,0	1º al inicio de la floración, 2º a los 15 días después de la 1º aplicación.
Palto, Mango	0,5 - 1,0	1º al inicio del brotamiento, 2º inicio de floración, 3º en el cuajado del fruto.
Olivo	0,5 - 1,0	1º antes de la floración, 2º 2 a 3 meses después, 3º cuando el fruto este engordando.
Caña de Azúcar	0,5 - 1,0	Aplicar a los 45 días después del corte.
Cebolla	0,5 - 1,0	Aplicar 15 días después del transplante, al inicio del bulbeo y llenado de cabezas.
Leguminosas	0,5 - 1,0	Aplicar al inicio de la floración y repetir 15 días después de la 1º aplicación.

Distribuido por:
Consortio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com

CODIAGRO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C.
Soluciones para la agricultura moderna